

## Espèces de la famille Histeridae (Coleoptera), provenant de la Nouvelle-Guinée

### The Scientific Results of the Hungarian Soil Zoological Expeditions\*

Par

J. THÉRON D \*\*

Je dois à l'obligeance de M. le Dr. KASZAB d'avoir pu examiner cette intéressante collection de 29 espèces d'Histerides, provenant de la région Sud-Est de la Nouvelle-Guinée. Je l'en remercie infiniment. Collecteurs du matériel: Prof. Dr. J. BALOGH et Dr. J. J. H. SZENTIVÁNY. Voici la liste de ces 29 espèces:

#### ***Trypeticus andainensis* GEST.**

(*Trypanaeus* [*Trypeticus*] *andainensis* GESTRO, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, 7, 1875, p. 994, type Nouvelle-Guinée. — Id. MARSEUL, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, 14, 1879, p. 258.)

Nouvelle-Guinée: Waing, à environ 30 kilomètres de Lae. 1 exemplaire.

#### ***Acritus* sp.**

Je ne puis donner un nom sûr à cet exemplaire unique d'*Acritus*, qui est de couleur chatain ferrugineux avec la tête plus foncée et les membres clairs et qui est caractérisé par l'absence d'une strie antéscutellaire et une ponctuation superficielle et peu dense, les points nettement séparés.

Nouvelle-Guinée: Waing, à environ 30 kilomètres de Lae. 1 exemplaire.

\* Present article is of the material of the first expedition to the New Guinea (1965). Leader of the expedition: Prof. Dr. J. BALOGH.

\*\* Dr. JEAN THÉRON D, 41, Rue Séguier, Nîmes, France.

### **Bacanius gestroi** SCHM.

(*Bacanius gestroi* J. SCHMIDT, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2), 13, 1893, p. 238, t. Nouvelle-Guinée.)

Nouvelle-Guinée: Rivière Brown, à 40 kilomètres au Nord de Lae; — entre Lae et Wau, à 65 kms. de Lae; Wau, Bishop Museum, Field Station. 22 exemplaires.

### **Bacanius hemisphaeroides** (MARS.)

(*Acritus hemisphaeroides* MARSEUL, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, 14, 1879, p. 284, t. Nouvelle-Guinée; — *Bacanius hemisphaeroides* BICKHARDT, Deutsche Ent. Zeitschr., 1913, p. 701.)

Nouvelle-Guinée: Wau, Mt. Missim, Balck Cat Can. 10 exemplaires.

### **Bacanius permirus** (MARS.)

(*Acritus permirus* MARSEUL, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, 14, 1879, p. 282. — *Bacanius permirus* J. SCHMIDT, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. (2), 13, 1893, p. 238.)

Répartition géographique: Java, Nouvelle-Guinée.

Nouvelle-Guinée: rivière Brown, à 40 kilomètres au Nord de Port-Moresby. Un exemplaire.

### **Eulomalus sculptipygus** (MARS.)

(*Paromalus sculptipygus* MARSEUL, l'Abeille, 1, 1864, p. 332. — *Eulomalus sculptipygus* COOMAN, Musée Heude, Notes d'Ent. Chin., 4, 1937, p. 116.)

Répartition: Moluques, Nouvelle-Guinée.

Nouvelle-Guinée: Suambe Plant., à 20 kilomètres au Sud de Lae. 1 exemplaire.

### **Eulomalus despectus** (MARS.)

(*Paromalus despectus* MARSEUL, l'Abeille, 1, 1864, p. 333. — *Eulomalus despectus* COOMAN, Musée Heude, Notes d'Ent. Chin., 4, 1937, p. 116.)

Répartition: Moluques, Nouvelle-Guinée.

Nouvelle-Guinée: Waing, à environ 29 kilomètres de Lae; Haus Copper Wau, Mt. Missim. 4 exemplaires.

### **Platylomalus oceanitis** (MARS.)

(*Paromalus oceanitis* MARSEUL, Monogr. Hister., 1855, p. 110. — Id. COOMAN, Musée Heude, Notes d'Ent. Chin., 4, 1937, p. 118. — *Platylomalus oceanitis* COOMAN, Musée Heude, Notes d'Ent. Chin., 12, 1948, p. 134.)

Répartition: Philippines, Java, Sumatra, Ceylon, Vietnam, Nouvelle-Guinée, Australie.

Nouvelle-Guinée: Waing, environ à 29 kilomètres de Lae. 3 exemplaires.

### **Platylomalus musicus (MARS.)**

(*Paromalus musicus* MARSEUL, l'Abeille, 1, 1864, p. 333. — Id., COOMAN, Musée Heude, Notes d'Ent. Chin., 4, 1937, p. 129. — *Platylomalus musicus* COOMAN, Musée Heude, Notes d'Ent. Chin., 12, 1948, p. 134.)

Répartition: Moluques, Nouvelle-Guinée.

Nouvelle-Guinée: Rivière Brown, à 40 kilomètres au Nord de Port-Moresby; entre Vanapa et la rivière Brown, à environ 45 kilomètres au Nord de Port-Moresby. 23 exemplaires.

### **Platylomalus lenticula (SCHM.)**

(*Paromalus lenticula* J. SCHMIDT, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2), 13, 1893, p. 236, t. Nouvelle-Guinée. — *Platylomalus lenticula* COOMAN, Musée Heude, Notes d'Ent. Chin., 12, 1948, p. 134.)

Nouvelle-Guinée: Waing, à près de 30 kilomètres de Lae. 7 exemplaires.

### **Hololepta indica ER.**

(*Hololepta indica* ERICHSON, in Jahrb. Insect. Klug, 1834, p. 90. — Id., MARSEUL, Monogr. Hister., 1853, p. 152. — *Hololepta batchiana* MARSEUL, Monogr. Hister. Supplmt., 1860, p. 588, t. Iles Batchian.)

Répartition: Inde, Vietnam, Formose, Philippines, Malaya, Sumatra, (I. Nias), Java, Nouvelle-Guinée (I. Batchian).

Nouvelle-Guinée: Waing, à près de 30 kilomètres de Lae. 1 exemplaire.

### **Hololepta immarginata SCHM.**

(*Hololepta immarginata* SCHMIDT, Entom. Nachr., 15, 1889, p. 129.)

Répartition: Bornéo, Laos, Nouvelle-Guinée (I. Arou).

Nouvelle-Guinée: Waing, à environ 29 kilomètres de Lae. 1 exemplaire.

### **Epierus beccarii MARS.**

(*Epierus beccarii* MARSEUL, Ann. Soc. Ent. Fr., 1871, p. 81.)

Répartition: Bornéo, Sumatra, Nouvelle-Guinée.

Nouvelle-Guinée: entre Vanapa et la rivière Brown, à environ 45 kilomètres au Nord de Port-Moresby; rivière Brown, à environ 40 kilomètres au Nord de Port-Moresby. 4 exemplaires.

### **Tribalus (Eutribalus) koenigius MARS.**

(*Tribalus koenigius* MARSEUL, l'Abeille, 1, 1864, p. 334. — *Tribalus (Eutribalus) koenigius* BICKHARDT, Archiv f. Naturg., 1921, p. 164.)

Répartition: Malaya, Nouvelle-Guinée (I. Arou), Sumatra, Vietnam.

Nouvelle-Guinée: entre Vanapa et la rivière Brown, à environ 45 kilomètres au Nord de Port-Moresby; rivière Brown, à 40 kilomètres au Nord de Port-Moresby; Wau, Bishop Museum, Field Station. 4 exemplaires.

### **Apobletes affinis SCHM.**

(*Apobletes affinis* J. SCHMIDT, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2), 13, 1893, p. 233, t. Nouvelle-Guinée.)

Nouvelle-Guinée: rivière Brown, à 40 kilomètres au Nord de Port-Moresby. 2 exemplaires.

### **Apobletes appendiculatus SCHM.**

(*Apobletes appendiculatus* J. SCHMIDT, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2), 13, 1893, p. 233, t. Nouvelle-Guinée.)

Nouvelle-Guinée: Waing, à environ 29 kilomètres de Lae. 1 exemplaire.

### **Apobletes amphibius MARS.**

(*Apobletes amphibius* MARSEUL, l'Abeille, 1, 1864, p. 288, t. Nouvelle-Guinée. — Id., J. SCHMIDT, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2), 13, 1893, p. 232.)

Nouvelle-Guinée: rivière Brown, à 40 kilomètres au Nord de Port-Moresby; Waing, à environ 29 kilomètres de Lae; Wau, Bishop Museum, Field Station. 7 exemplaires.

### **Apobletes maindroni DESB.**

(*Apobletes maindroni* DESBORDES, Bull. Soc. Ent. Fr., 1929, p. 296, t. Nouvelle-Guinée.)

Nouvelle-Guinée: Suambe Plant, à 20 kilomètres au Sud de Lae. 6 exemplaires.

### **Apobletes correctus MARS.**

(*Apobletes correctus* MARSEUL, l'Abeille, 1, 1864, p. 289, t. Nouvelle-Guinée.)

Nouvelle-Guinée: Waing, à 20 kilomètres environ de Lae. 1 exemplaire.

### **Apobletes montrouzieri MARS.**

(*Apobletes montrouzieri* MARSEUL, Monogr. Hister. Supplmt., 1860, p. 860.)

Répartition: Nouvelle-Calédonie, Moluques, Nouvelle-Guinée.

Nouvelle-Guinée: Waing, à environ 29 kilomètres de Lae; rivière Brown, à 40 kilomètres au Nord de Port-Moresby. 10 exemplaires.

### **Eurylister reinecki BICKH.**

(*Eurylister reinecki* BICKHARDT, Entom. Blätt., 16, 1920, p. 30, t. Nouvelle-Guinée.)

Nouvelle-Guinée: Wau, Bishop Museum, Field Station; Haus Copper, Wau, Mt. Missim. 3 exemplaires.

### **Eurylister discrepans MAR.?**

(*Platysoma discrepans* MARSEUL, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, 14, 1879, p. 260. — *Eurylister discrepans* BICKHARDT, Entom. Blätt., 15, 1919, p. 214.)

Répartition: Australie, Nouvelle-Guinée.

Nouvelle-Guinée: Wau, Bishop Museum, Field Station. 1 exemplaire.

J'ai laissé un point de doute à la détermination de cet exemplaire unique de son espèce, qui a la strie latérale du pronotum un peu interrompue derrière la tête, trois stries dorsales entières, la quatrième apicale ne remontant pas tout à fait au milieu de l'élytre, la cinquième marquée seulement de quelques points apicaux.

### **Platysoma loriae SCHM.**

(*Platysoma loriae* J. SCHMIDT, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2), 13, 1893, p. 234, t. Nouvelle-Guinée.)

Nouvelle-Guinée: Waing, à environ 29 kilomètres de Lae. 3 exemplaires.

### **Platysoma paugami (LE GUILL.)**

(*Hololepta paugami* LE GUILLOU, Rev. Zool., 1944, p. 223, t. I. Aroë. — *Platysoma Paugami* MARSEUL, Monogr. Hister., 1853, p. 264.)

Répartition: Nouvelle-Guinée (Is. Aroë), Australie.

Nouvelle-Guinée: Haus Copper Wau, Mt. Missim. 1 exemplaire.

### **Platysoma dahdah MARS.**

(*Platysoma dahdah* MARSEUL, Monogr. Hister., Supplmt., 1861, p. 148, t. I. Batchian.)

Répartition: Nouvelle-Guinée (I. Batchian), Australie.

Nouvelle-Guinée: Waing, à environ 29 kilomètres de Lae. 2 exemplaires.

## **Platysoma cribropygum MARS.**

(*Platysoma cribropygum* MARSEUL, l'Abeille, 1, 1864, p. 302.)

Répartition: Célèbes, Nouvelle-Guinée (I. Kei).

Nouvelle-Guinée: Vallée de la rivière Musgrave, à environ 55 kilomètres NNE de Port-Moresby; entre Vanapa et la rivière Brown, à environ 45 kilomètres au Nord de Port-Moresby. 2 exemplaires.

## **Platylister jobiensis (MARS.)**

(*Platysoma jobiense* MARSEUL, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, 14, 1879, p. 264, t. Nouvelle-Guinée. — *Platysoma (Platylister) jobiensis* BICKHARDT, Genera Insect., in Wytsnam, Histeridae, 1916, p. 143.)

Répartition: Nouvelle-Guinée, Australie.

Nouvelle-Guinée: rivière Brown à 40 kilomètres au Nord de Port-Moresby; Waing, à environ 29 kilomètres de Lae. 8 exemplaires.

## **Plaesius cossyphus MARS.**

(*Plaesius cossyphus* MARSEUL, l'Abeille, 1, 1864, p. 285. — Id. G. LEWIS, Ann. Mag. Nat. Hist. (7), 7, 1901, p. 241.)

Répartition: Moluques, Nouvelle-Guinée.

Nouvelle-Guinée: entre Vanapa et la rivière Brown, à environ 45 kilomètres au Nord de Port-Moresby.

## **Chlamydonsis sp. ?**

Je connais trop mal ce groupe d'Histeridae australiens, j'en ai vu trop peu de représentants pour oser donner un nom sûr à cet exemplaire unique de son espèce.

Nouvelle-Guinée: Haus Copper Wau, Mt. Missim. 1 exemplaire.

## **ZUSAMMENFASSUNG**

### **Histeriden aus Neuguinea (Coleoptera)**

Der Verfasser berichtet über 29 Histeriden-Arten, die von Professor J. BALOGH im Jahre 1965 in Neuguinea gesammelt worden sind. Die vorgefundenen Arten gehören 14 Gattungen an.